

Liste des contre-indications (CI)

	CI absolues	CI relatives
Cardiologie	Cardiopathie ischémique grave Insuffisance cardiaque Stade II Cardiomyopathie obstructive Pathologie avec risque de syncope Artérite sévère Tachycardie paroxystique BAV II ou complet Traitement en cours par anticoagulant	Hypertension artérielle sévère Cardiopathie congénitale Valvulopathies Infarctus récent Péricardite Traitement par antiarythmique ou β -bloquant

La plongée sollicite de façon importante le système cardio-vasculaire, et réalise même pour certains une épreuve d'effort à minima.

Tout souffle à l'auscultation, même fonctionnel, nécessite des investigations complémentaires.

	CI absolues	CI relatives
ORL	Surdit� unilat�rale totale Evidement pr�masto�dien Trach�ostomie Laryngoc�le D�ficit audiom�trique bilat�ral Otospongiose	Episode infectieux aig� ou chronique Polypose nasosinusienne Obstruction tubaire Syndrome vertigineux Perforation tympanique, tympanoplastie

Les accidents ORL repr sentent une part importante des atteintes barotraumatiques, avec parfois des cons quences importantes (surdit s, vertiges, ...).

	CI absolues	CI relatives
Pneumologie	Insuffisance respiratoire chronique Syndrome interstitiel Asthme vrai Pneumothorax spontan� Chirurgie thoracique	Pathologie infectieuse Pleur�sie Sarco�dose

Tout m canisme favorisant un pi geage de l'air au cours de la plong e (bronchospasme, bulle d'emphys me, pneumothorax, ...) entra nera une surpression pulmonaire   la remont e (cf. infra).

	CI absolues	CI relatives
Ophtalmologie	Patho. vasculaire de la rétine, choroïde, papille Glaucome à angle fermé Prothèse ou implant creux	Chirurgie oculaire < 6 mois Traitement pour décollement rétinien Kératotomie radiaire Kératocône

	CI absolues	CI relatives
Neurologie	Epilepsie Syndrome déficitaire sévère Pertes de connaissance Chirurgie endocrânienne	

Une perte de connaissance en cours de plongée expose à la noyade et/ou à la surpression pulmonaire.

	CI absolues	CI relatives
Psychiatrie	Affection psychiatrique sévère	Traitement antidépresseur, anxiolytique, neuroleptique

Les situations de stress importantes rencontrées au cours de la plongée souterraine imposent l'absence totale de pathologie préexistante dans le domaine psychiatrique.

	CI absolues	CI relatives
Locomoteur		Chirurgie osseuse récente Trauma crânien grave

L'importance des charges à transporter au cours des plongées (notamment en fond de trou) est à prendre en compte dans le cadre de l'aptitude « orthopédique ».

	CI absolues	CI relatives
Gynécologie		Grossesse

	CI absolues	CI relatives
Dentaire		Prothèse amovible, carie

	CI absolues	CI relatives
Métabolique	Diabète traité par insuline ou sulfamides Diabète non équilibré par régime oubiguanides	Tétanie / spasmophilie Troubles métaboliques ou endocriniens sévères

Une hypoglycémie chez un diabétique traité peut entraîner une perte de connaissance.

Divers		Ulcère digestif
---------------	--	-----------------